

Quando tranquillizzare in ambulatorio i genitori se....

La bambina ha troppi peli
"I trucchi del mestiere"

Ipertricosi sul pube e grandi labbra

La causa più frequente è l'applicazione ripetuta e ossessiva (con bendaggio) di pomate "protettive"



IPERTRICOSI DIFFUSA

- **ASPETTO** : ARMONICO
- **Forma idiopatica**: *NESSUNO ESAME*

- **ASPETTO**:
- DISARMONICO, DISMORFIE
- sindrome
- Diagnostica molecolare





PUBARCA PREMATURO

Forma tipica

1. Non sintomi di iperandrogenismo
2. Età ossea = età cronologica o entro + 2 anni
3. Statura > al bersaglio genetico ma normale per l'età ossea

DOSAGGIO BASALE di:
17 OHP : < 150 ng/dl
Testosterone : 40 ng/dl
DEAS : 300 mcg/dl

DIAGNOSI : Pubarca prematuro idiopatico
Non è necessario praticare il test all'ACTH



Test all'ACTH

- **INDICAZIONI :**
- 1. sintomi di iperandrogenismo (forma atipica)
- 2. Statura < bersaglio genetico per l'età ossea
- 3. femmine con 17OHP > 150 ng/dl
- 4. maschi con pubarca

Irsutismo nella bambina pubere

Comparsa lenta, cicli normali

- 17 OHP : < 150-200 ng/dl
- Testosterone : < 50-60 ng/dl
- DEAS : < 300-400 mcg/dl
- **IRSUTISMO PERIFERICO**

Comparsa rapida: sospettare l'origine tumorale ovarica o surrenalica



irsutismo

**Pelo sessuale non accompagnato
ad altri sintomi di iperandrogenismo**

Lattante e Prepubere: *inviare ad un centro*

**Androgeni surrenalici e ovarici
17OHP,T,DEAS, A**

+ ecografia /Rm pelvica/ surreni